

Webbstöd för vården

Att ställa frågor om våld – utbildningsmaterial för hälso- och sjukvården



Film 5 Hos allmänläkaren, återbesök

Magtarmsbesvär, smärttillstånd av oklar natur, ångest, sömnsvårigheter och depression är vanliga symtom hos patienter i primärvården. Om patienten varit utsatt för våld i sin relation är sådana symtom ännu vanligare. Nedstämdhet är till exempel fyra gånger vanligare hos våldsutsatta kvinnor. Patienten kan ha svårt att själv göra kopplingen mellan våldet och symtomen. Om man förklarar att det kan finnas ett samband kan det bidra till att hon så småningom kan förändra sin situation.

Det är inte så vanligt att patienten behöver hjälp akut. Ofta är det en lång process att först inse sin situation och sedan börja förändra den. Ett samtal som det i filmen måste alltid följas upp.

Diskussionsfrågor:

- Hur uppfattar patienten sin hemsituation?
- Tror du att hon skulle ha berättat om de emotionella och sexuella övergrepp hon utsätts för om hon inte hade fått en direkt fråga?
- Hur uppfattar du läkarens framtoning?

"Webbstöd för vården" är ett nationellt metod- och kompetensstöd för hälso- och sjukvården och tandvården. Webbstödet är framtaget av Nationellt centrum för kvinnofrid i samverkan med Socialstyrelsen.

Läs mer på www.nck.uu.se/webbstodforvarden